

Dryf pestycydów z pól uprawnych

Dwustronicowy materiał dla rodzin mieszkających przy polach. Najważniejszy wniosek: jeśli w domu jest ciąża, niemowlę lub dziecko 1-3 lata, warto zarządzać ekspozycją zanim pojawi się pewność po fakcie [16] [33].

POLSKA WERSJA EDUKACYJNA I PRZYGOTOWANA DO EKРАНU I DRUKU A4

4 pytania

czy pole jest blisko, czy wiatr wieje ku domowi, czy warunki są stabilne i czy w domu jest grupa wrażliwa

2 warstwy ochrony

ograniczenie pobytu na zewnątrz plus zmniejszenie wnoszenia pyłu do domu

MATERIAŁ OSTROŻNOŚCIOWY, NIE ALARMISTYCZNY

Wariant ostrożnościowy uruchom, gdy choć jedno z tych pytań brzmi „tak”

Kiedy narażenie może być większe

- pole lub strefa zabiegu znajdują się blisko domu albo placu zabaw,
- wiatr kieruje się ku zabudowie,
- zabieg odbywa się przy słabym mieszaniu powietrza lub wieczorem,
- dziecko spędza czas nisko przy podłożu lub bawi się przedmiotami z ogrodu.

Co robić od razu

- przenieś zabawę dziecka do środka,
- nie wietrz od strony pola,
- schowaj zabawki, pranie i pojemniki z wodą z ogrodu,
- po wejściu do domu zmień obuwie i umyj ręce dziecka.

Jak mówić o dystansie: większa odległość zwykle pomaga, ale sama nie rozstrzyga wszystkiego. Warunki zabiegu i to, co dzieje się po powrocie do domu, mają równie duże znaczenie [13] [15].

Pasma decyzji rodzinnej

WARUNKI	JAK POSTĄPIĆ
Niskie	brak wiatru ku domowi, brak grup wrażliwych, brak zabawy przy granicy pola
Podwyższone	bliskie pole lub dziecko na zewnątrz: przejdź na plan domowy na czas zabiegu
Ostrożnościowe	ciąża, niemowlę lub słabe mieszanie powietrza: utrzymaj plan także po zabiegu

Liczby modelowe w dłuższych materiałach mają charakter przesiewowy. W tym pamflecie priorytetem jest decyzja rodzinna, nie pseudo-precyzja.

PRZED ZABIEGIEM

Schowaj to, co dziecko bierze do ręki

Zabawki, koc, poidła, pranie i rzeczy pozostawione przy wejściu do domu.

W TRAKCIE

Ogranicz pobyt na zewnątrz

Jeśli masz wątpliwość co do kierunku wiatru lub warunków, wybierz aktywność w domu.

PO ZABIEGU

Zatrzymaj pył na progu

Zmiana obuwia, mycie rąk i szybkie przetarcie podłogi dają duży efekt praktyczny.

ŹRÓDŁA DO DALSZEGO CZYTANIA

[13] U.S. EPA: drift and runoff reduction measures • [15] U.S. EPA: pesticide volatilization • [16] EFSA: guidance for residents and bystanders • [33] Meta-analysis: pesticide exposure and preterm birth